



# ミニトマトも収穫前日まで 使えるようになりました。

## トマトもミニトマトも収穫前日まで使用OK!

トマト・ミニトマトの両方を栽培している場合も  
使いやすくなりました。

- 防除の難しい葉かび病・すすかび病に安定した高い効果!
- 多くの主要病害に効果があり、同時防除に最適!



※品種や散布時の条件によって果実が汚れる場合がありますので、  
はじめて使用する場合は事前に汚れ具合を確認してください。

**ワンポイント  
アドバイス**



果実の汚れが気になる場合は…

展着剤の加用により果実の汚れが軽減される  
事例があります。

## 使用回数に注意!

ト マ ト：散布回数**4回**以内（別途、土壌灌注も2回まで使えます）  
ミニトマト：散布回数**2回**以内（土壌灌注はできません）

この印刷物の記載内容は2016年7月末日現在のものです。

**ダコニール  
通信**

【ダコニール1000 トマト・ミニトマトでの散布剤としての使い方】

- 適用病害：疫病、葉かび病、すすかび病、灰色かび病、炭疽病、輪紋病、うどんこ病、斑点病（ミニトマトのみ）
- 使用時期：収穫前日まで
- 使用回数：散布はトマト4回以内、ミニトマト2回以内

やっぱり  
ダコニール

病気の同時防除&  
耐性菌対策!



ダコニールは株式会社エス・ディー・エス バイオテックの登録商標です。

●ラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。

**ダコニール普及会**

事務局  株式会社 **エス・ディー・エス バイオテック**