



アスパラガスの病害防除

アスパラガスは茎葉で光合成された栄養分が食用となる若い芽を萌芽させるため、病気で茎葉が枯れると直接収量や品質に影響します。


3大病害の**茎枯病**、**斑点病**、**褐斑病**を発生させないことが重要です。

立茎開始直後から茎枯病の予防散布スタート!



対策

立茎開始直後から**予防散布**とその後**7~10日間隔3回散布**でしっかり防除しましょう。



茎枯病



斑点病、褐斑病、茎枯病を同時に防除!




対策

梅雨や秋雨期には、**3大病害**の**斑点病**、**褐斑病**、**茎枯病**が増加します。発生前や初期から、**ダコニール1000**の**10~14日間隔散布**で同時防除しましょう。



斑点病



褐斑病

ダコニール1000は、3大病害に高い効果。

予防を徹底。散布の遅れとムラは厳禁。

病気が出ると収量が下がる~



疫病も同時防除できます!



疫病

写真原図: 社団法人 北海道植物防疫協会 児玉不二雄

この印刷物の記載内容は2015年3月現在のものです。

ダコニール 通信

【ダコニール1000 アスパラガスでの使い方】

- 散布剤としての適用病害: 茎枯病、斑点病、褐斑病、疫病
- 3回まで散布できます。

**ダコニール1000で
病気の同時防除&
耐性菌対策!**



ダコニールは株式会社エス・ディー・エス バイオテックの登録商標です。

●ラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●小児の手の届く所には置かないでください。

ダコニール普及会

事務局  株式会社 **エス・ディー・エス バイオテック**