

病気の予防と同時防除と

ダコニール 1000

「ダコニール」、「ダコニール1000」は株式会社エス・ディー・エス バイオテックの登録商標です。

病気、心配ではないですか？

毎年、困っていませんか？

ダコってみませんか？



心配するくらいなら
ダコ！ 先手必勝です。

1作で考えることで
手間とコストを削除！


アクセスしてね！
一作で考える病害
防除のポイント



発生する
病気と時期
を確認！

発生前・初期からの
定期的な予防散布で
感染させない。

以降も予防散布を継続。
発病したら治療効果を有する剤を散布。
治まったら予防剤で再感染を防ぐ。



【無人航空機散布剤としての適用病害と使用方法】

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期*	本剤の使用回数**	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数**
ばれいしょ	疫病、夏疫病	8	1.6ℓ/10a	7日	5回	無人航空機による散布	5回
しょうが	白星病	16	3.2ℓ/10a				
にんじん	黒葉枯病	8	1.6ℓ/10a	7日	5回	無人航空機による散布	5回(種子への吹き付け処理:1回)
		16	3.2ℓ/10a				
チューリップ	褐色斑点病	10~30	3ℓ/10a	発病前~発病初期	6回	無人航空機による散布	6回

【常温煙霧剤としての適用病害と使用方法】

作物名	適用場所	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期*	本剤の使用回数**	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数**
きゅうり	温室、ガラス室、 ビニールハウス等 密閉できる場所	べと病	33	10ℓ/10a	前日	12回	常温煙霧	14回(土壌灌注:2回、散布、常温煙霧、 くん煙及びエアゾル剤の噴射:合計12回)
なす		うどんこ病				4回		4回
トマト		すすかび病、葉かび病 褐色輪紋病、うどんこ病	3回			6回(土壌灌注:2回、散布、常温煙霧、 くん煙及びエアゾル剤の噴射:合計4回)		
ピーマン		うどんこ病	4回			3回		
アスパラガス		斑点病、褐斑病	4回			4回		

【土壌灌注剤あるいは種子消毒剤としての適用病害と使用方法】

作物名	適用病害名	希釈倍数(倍)	使用液量	使用時期	本剤の使用回数**	使用方法	TPNを含む農薬の総使用回数**
稲(箱育苗)	苗立枯病 (リゾプス菌)	500~1000	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5ℓ) 1箱当り500ml	は種時から緑化期 但し、は種14日後まで	2回	土壌灌注	2回
		1000~2000	育苗箱(30×60×3cm、使用土壌約5ℓ) 1箱当り1ℓ				
きゅうり	苗立枯病 (リゾクトニア菌)	1000	3ℓ/m ²	は種時又は活着後 但し、定植14日後まで	2回	土壌灌注	14回(土壌灌注:2回、散布、常温煙霧、 くん煙及びエアゾル剤の噴射:合計12回)
トマト							6回(土壌灌注:2回、散布、常温煙霧、 くん煙及びエアゾル剤の噴射:合計4回)
レタス	ビッグベイン病	1000	1.5~3ℓ/m ²	42日	2回	土壌灌注	5回(土壌灌注:2回、 散布及び無人航空機散布:合計3回)
ブロッコリー	根こぶ病	500	3ℓ/m ²	定植時	1回	土壌灌注	3回(土壌灌注:1回、 散布及び無人航空機散布:合計2回)
みずな	立枯病			は種時			1回
ねぎ	苗立枯病 (リゾクトニア菌)	500	0.5ℓ/m ²	出芽揃い後 (出芽3日後から10日後まで)	1回	土壌灌注	4回(土壌灌注:1回、 散布及び無人航空機散布:合計3回)
わけぎ			セル成型育苗トレイ1箱または ペーパーポット1冊 (30×60cm、使用土壌約5ℓ) 当り0.5ℓ				3回(土壌灌注:1回、 散布:2回)
にんじん	黒葉枯病	12	乾燥種子1kg当り60ml	は種前	1回	吹き付け処理 (種子消毒機使用)	5回(種子への吹き付け処理:1回)

※印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫(摘採)前の日数と、本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示しています。

病害の同時防除に。

ダコニール1000

「ダコニール」、「ダコニール1000」は株式会社エス・ディー・エス バイオテックの登録商標です。



daco-club.com



有効成分：テトラクロロイソフタロニトリル(TPN)…40.0%w/w 性状：類白色水和性粘稠懸濁液体

※印は収穫物への残留回避のため、その日まで使用できる収穫(摘採)前の日数と、本剤及びその有効成分を含む農薬の総使用回数(制限)を示しています。 2024年6月末日現在

【散布剤としての適用病害と使用方法】

作物名	適用病害名	希釈倍率(倍)	使用液量	使用時期*	本剤の※使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数※	作物名	適用病害名	希釈倍率(倍)	使用液量	使用時期*	本剤の※使用回数	TPNを含む農薬の総使用回数※						
きゅうり	べと病、炭疽病、うどんこ病、褐斑病、灰色かび病、黒星病	1000	1000	前日	12回	14回(土壌灌注:2回、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射:合計12回)	もりあざみ	ステムフィリウム葉枯症	1000	100~300 g/10a	30日	3回	3回						
					4回	4回					14日	4回	4回						
					3回	3回					*4	4回	4回						
					5回	5回					出蕾前	2回	3回(土壌灌注:1回、散布及び無人航空機散布:合計2回)						
					4回	4回					但し、21日	2回	3回						
ながり	べと病、炭疽病、うどんこ病、斑点病、つる枯病	1000	1000	前日	7日	3回	3回	網もち病、褐色円星病	1000	100~300 g/10a	10日	1回	1回						
					3日	5回	5回	黒葉腐病、灰色かび病、炭疽病、もち病、輪斑病、新梢枯死症(輪斑病類による)			700	200~400 g/10a	21日	2回	2回				
					7日	3回	3回	斑点病、萎縮炭疽病			700~1000	700~1000	7日	5回	5回(種子への吹き付け処理:1回)				
					3日	5回	5回	黒葉枯病			1000	1000	根根養成分期	3回	3回				
					7日	3回	3回	べと病			1000	1000	但し、75日	3回	3回				
ズッキーニ	うどんこ病	1000	1000	前日	4回	6回(土壌灌注:2回、散布、常温煙霧、くん煙及びエアゾル剤の噴射:合計4回)	しゃくやく(薬用)	うどんこ病	1000	100~300 g/10a	45日	15回(1年間に3回)	15回(1年間に3回)						
					3回	3回	せんぶり	さび病			7日	12回(1年間に6回)	12回(1年間に6回)						
					5回	5回	みしまさいこ	炭疽病			800	100~300 g/10a	30日	3回	3回				
					4回	4回	らっかせい	褐斑病			500	500	14日	4回	4回				
					2回	2回	食用ぎく	食用ゆり			2回	2回	30日	4回	4回				
うり類(漬物用、但し、ゆがおを除く)	べと病、炭疽病、うどんこ病、つる枯病	1000	1000	前日	4回	4回	食用ゆり	葉枯病	1000	100~300 g/10a	14日	6回	6回						
					3回	3回	ふき	灰色かび病			21日	2回	2回						
					7日	3回	あしたば	黒枯病			30日	3回	3回						
					3回	3回	てんさい	褐斑病			根根養成分期	3回	4回(散布:3回、根根養成分期:1回)						
					28日	2回	うど	黒斑病			1000	1000	150 g/10a(株元散布)	前日	4回	4回			
ゆがお	べと病、炭疽病、うどんこ病	1000	1000	前日	14日	3回(種又は定植前の土壌灌注:1回、散布及び無人航空機散布:合計2回)	りんご	斑点落葉病、モニア病、黒星病	1000	100~300 g/10a	45日	3回	3回						
					3日	5回	なご	黒斑病、黒星病			前日	6回	6回						
					7日	3回	もも	灰星病、黒星病			2000	2000	2回	2回					
					28日	2回	ネクタリン	疫病、黒葉枯病、黒かび病、さび病			500~1000	500~1000	60日	7回	7回				
					60日	3回	いちじく	果実軟腐病			2000	2000	すず病病	前日	5回	5回			
うり類(漬物用、但し、ゆがおを除く)	べと病、炭疽病、うどんこ病、つる枯病	1000	1000	前日	出蕾前	3回	マルメロ	ごま色斑点病	1000	100~300 g/10a	30日	4回	4回						
					14日	3回	かりん	黒点病、ごま色斑点病、白かび斑点病			1000	1000	45日	3回	3回				
					45日	3回	パッションフルーツ	円斑病、疫病			700~1000	25~150 g/10a	14日	2回	2回				
					21日	2回	たばこ	うどんこ病			700~1000	25~150 g/10a	10日	2回	2回				
					7日	6回	たばこ	うどんこ病			700~1000	25~150 g/10a	10日	2回	2回				
なす	黒枯病、灰色かび病、すすかび病、うどんこ病	1000	1000	前日	4回	4回(土壌灌注:1回、散布及び無人航空機散布:合計3回)	花き類・観葉植物(ばら、きく、チューリップ、ゆり、りんどうを除く)	うどんこ病、斑点病	1000	100~300 g/10a	6回	6回	6回						
					3回	3回	ばら	黒星病、うどんこ病、斑点病			1000	100~300 g/10a	6回	6回	6回				
					7日	6回	きく	黒斑病、褐斑病、白さび病、うどんこ病、斑点病					1000	100~300 g/10a	6回	6回	6回		
					14日	3回	チューリップ	褐色斑点病							1000	100~300 g/10a	6回	6回	6回
					14日	3回	ゆり	葉枯病、斑点病									1000	100~300 g/10a	6回
ピーマン	斑点病、うどんこ病、黒枯病、炭疽病	1000	1000	前日	4回	4回	りんどう	葉枯病、褐斑病	1000	100~300 g/10a									6回
					3回	3回	しきみ	炭疽病			1000	100~300 g/10a							6回
					7日	3回	つつじ類	褐斑病					1000	100~300 g/10a					6回
					14日	3回	西洋芝(ペントダラス、パーミューダラス)	ヘルミントスポリウム葉枯病、葉腐病(ブラウンパッチ)							500~750	1g/ml			発病初期
					30日	6回	6回	6回							500~750	1g/ml	発病初期	8回	8回
45日	6回	6回	6回	500~750	1g/ml	発病初期	8回	8回											
45日	6回	6回	6回	500~750	1g/ml	発病初期	8回	8回											
オクラ	葉すす病	1000	1000	前日	4回	4回	6回	6回	1000	100~300 g/10a	6回	6回	6回						
					3回	3回	6回	6回			1000	100~300 g/10a	6回	6回	6回				
					7日	3回	6回	6回					1000	100~300 g/10a	6回	6回	6回		
					14日	3回	6回	6回							1000	100~300 g/10a	6回	6回	6回
					21日	2回	2回	2回									1000	100~300 g/10a	6回
メロン	うどんこ病、つる枯病	1000	1000	前日	4回	4回	6回	6回	1000	100~300 g/10a									6回
					3回	3回	6回	6回			1000	100~300 g/10a							6回
					7日	3回	6回	6回					1000	100~300 g/10a					6回
					14日	3回	6回	6回							1000	100~300 g/10a			6回
					21日	2回	2回	2回									1000	100~300 g/10a	6回
トマト	疫病、葉かび病、輪紋病、炭疽病、灰色かび病、すすかび病、うどんこ病、褐色輪紋病、斑点病	1000	1000	前日	4回	4回	6回	6回	1000	100~300 g/10a									6回
					3回	3回	6回	6回			1000	100~300 g/10a							6回
					7日	3回	6回	6回					1000	100~300 g/10a					6回
					14日	3回	6回	6回							1000	100~300 g/10a			6回
					21日	2回	2回	2回									1000	100~300 g/10a	6回
ミニトマト	疫病、葉かび病、輪紋病、炭疽病、灰色かび病、すすかび病、うどんこ病、褐色輪紋病、斑点病	1000	1000	前日	4回	4回	6回	6回	1000	100~300 g/10a									6回
					3回	3回	6回	6回			1000	100~300 g/10a							6回
					7日	3回	6回	6回					1000	100~300 g/10a					6回
					14日	3回	6回	6回							1000	100~300 g/10a			6回
					21日	2回	2回	2回									1000	100~300 g/10a	6回
なす	黒枯病、灰色かび病、すすかび病、うどんこ病	1000	1000	前日	4回	4回	6回	6回	1000	100~300 g/10a									6回
					3回	3回	6回	6回			1000	100~300 g/10a							6回
					7日	3回	6回	6回					1000	100~300 g/10a					6回
					14日	3回	6回	6回							1000	100~300 g/10a			6回
					21日	2回	2回	2回									1000	100~300 g/10a	6回
オクラ	葉すす病	1000	1000	前日	4回	4回	6回	6回	1000	100~300 g/10a									6回
					3回	3回	6回	6回			1000	100~300 g/10a							6回
					7日	3回	6回	6回					1000	100~300 g/10a					6回
					14日	3回	6回	6回							1000	100~300 g/10a			6回
					21日	2回	2回	2回									1000	100~300 g/10a	6回
ピーマン	斑点病、うどんこ病、黒枯病、炭疽病	1000	1000	前日	4回	4回	6回	6回	1000	100~300 g/10a									6回
					3回	3回	6回	6回			1000	100~300 g/10a							6回
					7日	3回	6回	6回					1000	100~300 g/10a					6回
					14日	3回	6回	6回							1000	100~300 g/10a			6回
					21日	2回	2回	2回									1000	100~300 g/10a	6回
はくさい	べと病、白さび病、白斑病、黒斑病	1000	1000	前日	4回	4回	6回	6回	1000	100~300 g/10a									6回
					3回	3回	6回	6回			1000	100~300 g/10a							6回
					7日	3回	6回	6回					1000	100~300 g/10a					6回
					14日	3回	6回	6回							1000	100~300 g/10a			6回
					21日	2回	2回	2回									1000	100~300 g/10a	6回
非結球はくさい	白斑病	1000	1000	前日	4回	4回	6回	6回	1000	100~300 g/10a									6回
					3回	3回	6回	6回			1000	100~300 g/10a							6回
					7日	3回	6回	6回					1000	100~300 g/10a					6回
					14日	3回	6回	6回							1000	100~300 g/10a			6回
					21日	2回	2回	2回									1000	100~300 g/10a	6回
キャベツ	べと病、根朽病	1000	1000	前日	4回	4回	6回	6回	1000	100~300 g/10a									6回
					3回	3回	6回	6回			1000	100~300 g/10a							6回
					7日	3回	6回	6回					1000	100~300 g/10a					6回
					14日	3回	6回	6回							1000	100~300 g/10a			6回
					21日	2回	2回	2回									1000	100~300 g/10a	6回
なばな類(なばなを除く)	べと病、白さび病、白斑病、黒斑病	1000	1000	前日	4回	4回	6回	6回	1000	100~300 g/10a									6回
					3回	3回	6回	6回			1000	100~300 g/10a							6回
					7日	3回	6回	6回					1000	100~300 g/10a					6回
					14日	3回	6回	6回							1000	100~300 g/10a			6回
					21日	2回	2回	2回									1000	100~300 g/10a	6回
だいこん	ワッカ症、白さび病、白斑病、炭疽病	1000	1000	前日	4回	4回	6回	6回	1000	100~300 g/10a									6回
					3回	3回	6回	6回			1000	100~300 g/10a							6回
					7日	3回	6回	6回					1000	100~300 g/10a					6回
					14日	3回	6回	6回							1000	100~300 g/10a			6回
					21日	2回	2回	2回									1000	100~300 g/10a	6回
レタス	灰色かび病	1000	1000	前日	4回	4回	6回	6回	1000	100~300 g/10a									6回
					3回	3回	6回	6回			1000	100~300 g/10a							6回
					7日	3回	6回	6回					1000	100~300 g/10a					6回
					14日	3回	6回	6回							1000	100~300 g/10a			6回
					21日	2回	2回	2回									1000	100~300 g/10a	6回
非結球レタス	べと病、すす枯病	1000	1000	前日	4回	4回	6回	6回	1000	100~300 g/10a									6回
					3回	3回	6回	6回			1000	100~300 g/10a							6回
					7日	3回	6回	6回					1000	100~300 g/10a					6回
					14日	3回	6回	6回							1000	100~300 g/10a			6回
					21日	2回	2回	2回									1000	100~300 g/10a	6回
たまねぎ	べと病、灰色かび病、白色疫病	1000	1000	前日	4回	4回	6回	6回	1000	100~300 g/10a									6回
					3回	3回	6回	6回			1000	100~300 g/10a							6回
					7日	3回	6回	6回					1000	100~300 g/10a					6回
					14日	3回	6回	6回							1000	100~300 g/10a			6回
					21日	2回	2回	2回									1000	100~300 g/10a	6回
ねぎ	黒斑病、べと病、小菌核腐敗病、葉枯病、さび病	1000	1000	前日	4回	4回	6回	6回	1000	100~300 g/10a									6回
					3回	3回	6回	6回			1000	100~300 g/10a							6回